

Des hernies qu'on appelle fausses 1



Cote neuf feuillets
Le Bibliothicaire

J. Ducreux

L'hydrocelle, le varicocelle, le Sarcocelle, sont des maladies, qui attaquent le Scrotum et que la plus part des auteurs ont mises au rang des hernies sous le nom des hernies fausses, ou similitudinaires, parce qu'elles ressemblent aux vraies hernies, formées par la sortie de l'épiphlocon, ou de l'intestin hors du ventre.

L'hydrocelle est une tumeur aqueuse; le varicocelle est une tumeur faite par la dilatation des vaisseaux sanguins; et le Sarcocelle est une tumeur qui forme le testicule même, lorsqu'il devient carcinomateux; ou bien, suivant quelque uns, le Sarcocelle est une excroissance de chairs attachée au Corps du testicule.



De L'hydrocelle

L'hydrocelle est une apoplexie aqueuse, qui occupe le Scrotum totalement, ou en partie, cette tumeur n'est souvent qu'une infiltration de Scrofite. Dans les différents tissus cellulaires des membranes, qui couvrent, et enveloppent les Cordons spermatiques et les testicules même; et cette espèce peut être regardée comme

ARC 18 d 7 m 8

un adême, au quel on donne le nom d'hydrocele ;
c'est ce que l'on appelle hydrocele par infiltration ;
D'autres fois l'hydrocele est une véritable hydrocèle
C'est à dire une collection, ou amas d'eau
Épanchée, et cette espèce est nommée hydrocele
par épanchement. La première espèce a différents
sièges ; quelque fois l'infiltration a démesurée
se trouve dans le tissu cellulaire du muscle,
Dartos ; d'autre fois dans les cellules qui sont
entre ce muscle et le crémaster ; de
manière que le Cordon des vaisseaux, et les autres
membranes qui l'enveloppent. Sont dans leur état
naturel ; d'autres fois le crémaster, et les autres
membranes propres, sont abreuvées ces eaux, sans
que le tissu cellulaire du dartos le soit ; ce qui
est rare ; c'est pour l'ordinaire, lorsque l'adême
est aux membranes propres, il est aussi aux membranes
on distingue facilement l'une et l'autre espèce
d'hydrocele par l'étendue des parties qu'elles
occupent, car quand l'adême est aux membranes
propres, il n'occupe souvent qu'un côté ; et s'il
occupe les deux, sans que les membranes
communes soient attaquées de l'adême, il est

facile de le distinguer au touché, parce que le Serotum
est mobile; au lieu que quand l'adème est aux membranes
Communes, la peau paroit adhérente, elle n'est point
mobile, et de plus elle est lisse, Blanche, et luisante
au contraire, quand l'adème n'est que dans les membranes
propres, la peau est ridée; et de couleur naturelle;
j'ajouterais qu'il est rare que l'adème des membranes
externes soit d'un côté seulement; j'occupe pour
l'ordinaire tout le Serotum; au lieu que l'adème des
membranes propres est le plus souvent d'un seul côté;
on en sent bien la raison.

Les espèces d'hydrocele; dont je viens de parler
sont toujours des adèmes, on peut mieux expliquer mieux
le fluide qui les forme est infiltré dans les membranes
cellulaires, soit particulières à un seul côté, soit
Communes à tous les deux; mais jls peuvent, par
Succession de temps, changer de nature; c'est à dire,
que les cellules, ou les vaisseaux lymphatiques,
qui contiennent la Serofite et forment des idatides,
peuvent se rompre; a lors le fluide se répand,
il s'amasse dans une seule cavité, et forme ce
que nous appellons hydrocele par épanchement; et
comme cet épanchement peut se faire



immédiatement sous le darto, qu'il peut se
former sous le cremaster, et enfin sous les autres
membranes propres du Cordon Spermétique, cela a
donné lieu à nos auteurs de faire différentes espèces
d'hydrocelle par épanchement: je ne remarque point
en doute ce que les différents auteurs en ont dit;
cependant je ne crois pas que ces différentes
espèces d'hydrocelle par épanchement soient si
communes qu'ils le disent.

L'hydrocelle par épanchement a donc une poche,
Kiste, dans laquelle l'eau est contenue, et
c'est celle, à laquelle, la ponction avec le troi-
cart convient; la cavité du péritonée est la seule
à qui puisse convenir le nom d'hydrocèle, car il
faut que la cavité, qui renferme, les eaux, soit
une cavité du bas ventre, de la poitrine, du
péricarde, des jointures, ~~de la~~ et autres, dans
lesquelles se forment les hydrocèles ascites,
thoraciques &c. Ce n'est pas en cela seul que
les autres épanchements d'eau dans la bourse
diffèrent de ce que j'appelle, vrai hydrocelle par
épanchement, qui se forme dans le péritonée,
c'est à dire, dans la membrane qui enveloppe,

L'estercule, et qui fait à son égard, ce que fait
 le péricarde, à l'égard du cœur elle l'enveloppe sans
 y être attachée. je trouve même une analogie
 parfaite entre ces deux membranes; en effet,
 le péricarde n'est attaché qu'à la base du
 cœur; dans le reste de son étendue, il n'y a
 aucune adhérence; le cœur dans ses mouvements
 glisse contre la surface interne du péricarde;
 et pour qu'il y glisse encore plus facilement,
 la nature fournit une liqueur qui mouille et
 lubrifie la surface du cœur, et celle du
 péricarde. il en est de même de l'estercule; il est
 enveloppé dans une membrane, qui fait à son égard,
 ce que le péricarde fait à l'égard du cœur; cette
 membrane n'est attachée qu'à la membrane du
 corps pépiniforme, à l'endroit où le vaisseau
 defferent, entortillé sur lui-même, forme
 le pygidium; le reste de l'étendue de cette
 membrane n'a aucune adhérence, de sorte
 que dans nos différents mouvements, l'estercule
 peut glisser contre la surface interne du
 periteste; et pour qu'il y glisse avec plus de



facilité, leurs Surfaces Sous mouillées
d'une liqueur qui fait à l'égard du testicule,
ce que l'eau du péricarde fait à l'égard du
Cœur. et pour suivre cette analogie, je
dirai que, Comme cette liqueur, Retenue
dans le péricarde, y forme quelque fois —
hydroppie, celle qui est Retenue dans le
périteste, y forme hydrocelle; et c'est —
Comme j'ai dit le seul hydrocelle par épanchement
que je Connaisse. D'ailleurs y trouverait on cette
différence, puis que la liqueur qui forme celui
ci est une liqueur naturelle, qui n'a pas trouvé
les pot absorbans qui la ~~ne~~ rapporte dans
la masse. D'ailleurs est que la liqueur qui forme les
autres, a été obligé de rompre les cellules
ou les vaisseaux dans lesquels on suppose que
si cela étoit, l'hydrocelle seroit toujours de
figure presque ronde; qu'on ne la verroit pas
allongée, et s'élever jusqu'à l'anneau de l'oblique
interne; de plus, l'on ne sentiroit pas au touché
le testicule. Comme distinct, et séparé de
l'hydrocelle.

à toutes ces objections je répondrai 1^o que
 l'hydrocelle, par épanchement sous son commence-
 ment, est toujours de forme ronde; ce n'est que
 par succession de temps qu'il s'allonge, soit en
 forçant la partie Supérieure du Kiste qui l'enveloppe,
 soit en le relâchant; qu'ainsi il peut se tendre
 jus qu'aux anneaux, à l'égard du testicule, que
 l'on dit appercevoir séparé de l'atameal, je crois
 qu'on se trompe; quand l'hydrocelle est considérable,
 on ne l'apperceoit facilement que par le côté
 opposé à l'atameal; c'est à dire du côté du
 Septum médium, auquel le péritestis est attaché
 encore est il rare qu'on l'apperceive en ce lieu
 quel qu'attention qu'on y fasse; parce qu'il est si bien
 caché du côté malade, que tous ceux qui veulent faire
 la ponction le cherchent avec soin, pour éviter de
 le piquer avec le troiscart; ou si le testicule étoit
 si apparent, on ne le chercheroit pas pour l'éviter.
 mais si l'on veut se convaincre de ce que j'avance,
 il faut observer le commencement, et le progrès d'un
 hydrocelle; c'est ce que j'ay fait toutes les fois que
 l'occasion s'est présentée: la première chose dont
 se plaint le malade est d'avoir un testicule plus gros



que l'autre: Dans un grand nombre de personnes,
qui sont venues me trouver pour pareille chose,
j'ay reconnu veritablement un testicule plus gros que
l'autre; le malade se plaignant d'une douleur
sourde, quelque fois tensive, et gravative;
l'attouchement n'en augmentoit point la douleur; les
Remedes généraux et quelques topiques employes ont
fait souvent dissiper le tout, d'autre fois le tumeur
ne faisoit que s'amolir devenoit moins douloureuse,
quoiqu'elle augmentat, dans cet état on appercevoit
point encore de fluctuation enfin quelque jour
après en faisant beaucoup d'attention et en touchant
avec circonspection et douceur je sentoie un fluide
faisant pour ainsi dire un atmosphere autour du
testicule cet atmosphere aqueux augmentant
peu à peu, l'hydrocele, par degre, devint plus
apparent; on distingue encore les testicules au
milieu de cet amas d'eau pourvu que l'on presse
latement avec deux doigts posée aux deux côtés de
son petit diamètre, car alors en la pressant ainsi
on repousse les eaux vers les pôles ou grand
diamètre; et ces doigts s'approchant ontouche
les testicules; mais par la suite les eaux

augmentent au point que la distance qu'il y a
 entre les testicules et la membrane qui contient les
 eaux est si considérable que quel que pression
 que l'on fasse on ne peut approcher les doigts du
 testicule sans causer de la douleur, ce qu'il faut
 éviter; c'est pour lors qu'on n'apperceoit plus le
 testicule; si ce n'est vers l'endroit où commence
 le corps pyramiforme, mais par la suite cet
 endroit est lui même caché par le progrès que fait
 l'hydrocele de ce côté là et cette tumeur qui jus
 qu'ici a toujours été ronde devient peu à peu
 oblongue, se lève jus qu'aux anneaux et devient
 quel que fois si grosse qu'elle s'étend jusques sur le
 ventre: voilà quel est le progrès de cette tumeur
 C'est ce que j'ai vu et bien observé plusieurs fois.
 Si l'on n'a point vu cette tumeur dans son
 commencement, si l'on n'a point vu les différens
 progrès on peut facilement se tromper. Lors qu'un
 malade se présente à nous pour la première fois
 avec une tumeur aussi grosse que peut être un
 hydrocele dans son dernier degré d'accroissement
 ce n'est pas qu'on puisse douter que cette maladie
 soit un hydrocele, la fluctuation y est trop apparente,
 mais n'ayant pas vu le commencement quelle



preuve avons nous que cette tumeur n'est
qu'un hydrocele; Bien loin de n'être qu'un simple
hydrocele on y trouve souvent plusieurs autres maladies
renfermées que l'on ne presseroit pas et qui sans doute
auroient été reconnues si dans le commencement le
malade se fut adressé à quelque chirurgien
éclairé qui auroit pu les prévenir ou qui du moins
les ayant vu croître en même tems que l'hydrocele
seroit en état de rapporter les changements qui sont
arrivés à tous les degrés d'accroissement et pourroit
plus qu'un autre juger de la maladie et de moyens
de y remédier: mais c'est le malheur de ceux qui
sont affligés de maladies dans ces lieux cachés, une
honte mal entendue fait qu'ils ne se déclarent. qu'à
l'extrémité j'en rapporterai plusieurs exemples dans
les signes je conclus donc de tout ce que je viens
de dire de l'hydrocele par épanchement qu'il est
rare que les eaux soient épanchées dans d'autres lieux
que dans la cavité du péricrète: mais j'en donne
des preuves plus convaincantes; je prie ceux qui
ont fait beaucoup de ponction de se ressouvenir
qu'à mesure que les eaux se vuident par le trou

1. La canule; cette Canule, pousée par le Resort
 Du Portos et Du remartel d'Amiroche, peu à peu Intestinale
 Du Portos, et lors que ^{UV} les canules ^{UV} ont entièrement pénétrées
 dans la canule, s'étouffe pressée entre le sac
 2. L'hydrocele et le testicule ce qui a fait croire
 à quelques spectateurs que l'on avoit porté le
 troicart dans le Corps même du testicule: ceux qui
 nous ont fait cette Remarque, la feront sans doute
 et je peux les assurer qu'ils trouveront ce que je
 dis. J'ajouterai à ces preuves cette dernière qui est
 la plus convainquante j'ai fait plusieurs fois
 l'opération que l'on appelle curative, car la
 fonction ne l'est ^{UV} par ordinairement: j'ai fait, si je
 cette opération en ouvrant l'hydrocele: dans toute
 son étendue et j'ai toujours trouvé le testicule
 à nu et donc on fait que jamais l'hydrocele
 par épanchement ne se fait ailleurs, si ce n'est
 de la manière que j'ai dit cy dessus; mais cela
 est bien rare, à toutes ces espèces d'hydrocele on
 pourroit ajouter celles qui sont ~~par~~
 vaineux qui accompagnent ou qui suivent les hémorrhoides
 vaine, il en sera parlé en traitant des abcès
 et des fistules au périnée



Des Signes des différences l'hydrocèle


La plupart de ceux qui ont quelques maladies
des parties naturelles s'ont trompés
à cet égard ce qui fait que lors qu'ils se déclarent on
ne peut se faire de la peine à distinguer de quel genre
est leur maladie, elle peut souvent paraître sous
d'autres, comme il est arrivé de pendre de l'hydrocèle
pour un tumeur de l'hydre, du testicule
ou d'une autre partie, pour savoir si elle est
au commencement de la maladie et si parties aussi
parce que les deux signes essentiels de l'hydrocèle
transparence et la fluctuation qui ne se rencontrent
pas, car ce sont les deux signes qui caractérisent
la tumeur aqueuse de l'hydrocèle. Soit l'hydrocèle
soit infiltration. Soit l'hydrocèle par épanchement
On sçait que pour observer s'il y a transparence,
on se met dans un lieu obscur, on prend la tumeur
dans la main gauche, on appuie la droite sur
le sommet de la tumeur et l'on porte la vue sur
le côté de la tumeur pendant qu'on fait tenir une
bougie allumée à côté opposé, on sçait aussi
que pour connoître s'il y a fluctuation on touche

la tumeur avec Les deux main l'une placée à l'épave de l'autre et à l'ors on comprime alternativement non avec toute la main; mais seulement avec les deux pouces; de manière que le pouce qui cesse de comprimer reste sur la tumeur pour recevoir ce flot des eaux que renvoie l'autre pouce; ainsi alternativement les eaux sont poussées par l'un des pouces pendant que l'autre reçoit le flot qui lui est renvoyé.

Combien de jeunes chirurgiens se croiront habiles lors qu'ils sauront que la fluctuation et la transparence annoncent l'hydrocèle; mais aussi combien de fois seront ils trompés lorsque, n'apercevant ni transparence ni fluctuation ils assureront qu'il n'y a point d'hydrocèle. il faut donc bien faire observer ici qu'il y a des cas où l'hydrocèle n'a ni l'un ni l'autre de ces deux signes.

1^{er} cas }
2^e cas }

Il n'y a point de fluctuation sensible lorsque l'eau est si étroite dans son kiste que le flot ne peut passer d'un côté à l'autre sans distinctement pour être aperçu; de plus pour que ce flot frappe le coit il faut qu'il vienne de loin: or dans l'hydrocèle qui n'a point un grand volume le kiste est fort tendu et le flot ne vient pas d'assez loin pour le



faire & appercevoir

1^{re}
(a)
Lorsqu'il y a gonflement intestinal, la fluctuation est encore très difficile à constater. Il faut redoubler l'attention pour l'apercevoir.

3^e
(a)
Lorsqu'il y a en même temps inflammation au Scrotum ou quand il y a hydrocèle, par infiltration on ne distingue pas le flot de l'hydrocèle, pas par conséquent.

4^e
(a)
Lorsqu'il y a hernie intestinale, ou épiploïque la fluctuation est très obscure.

5^e
(a)
Enfin la transparence ne se peut trouver, dans plusieurs des cas que je viens de rapporter, mais encore lorsque le fluide renfermé est pur, et que le kiste est épais; dans l'un et l'autre cas, le passage des rayons de la lumière est intercepté et l'on sait que l'on en l'autre doivent arriver. Lorsque l'hydrocèle a été précédé d'une inflammation considérable, et c'est pour l'ordinaire la suite de ce que l'on appelle, chaude pisse, tombée, dans les bourses. Toutes ces observations montrent combien il est prudent à un chirurgien de ne rien prononcer sur le caractère d'une maladie qu'après avoir bien réfléchi sur toutes les choses qui ont précédé; Car comme on peut avoir parce que j'ai dit il peut y avoir transparence sans fluctuation et

fluctuation sans transparence: Dans l'hydrocele
 pas infiltration, il y a transparence sans fluctuation
 et dans l'hydrocele pas épanchement la fluctuation
 peut être sans transparence: mais la fluctuation
 est quelque fois fort équivoque. j'ai vu percer des
 tumeurs aux quelles on croyoit sentir la fluctuation
 et qui ne rendoient aucun fluide, l'une étoit
 un hydrocele pas infiltration à la vérité celui qui
 fit cette ponction ne toit pas chirurgien, il avoit
 vu percer une hydrocele: il crut en pouvoit faire
 autant avec un troi cart qu'il emprunta: mais
 comme il ne connoissoit pas la maladie, il ne
 sçavoit pas que cette opération ne convenoit point
 dans l'espèce dont il s'agissoit, il ne tira que
 quelques gouttes d'eau et de sang, ce qui, le trouva fort,
 il crut n'auroit pas poussé assez avant son instrument,
 il repassa le troi cart dans la canule et poussa
 plus avant; mais il ne réussit pas mieux et cette
 seconde témérité pen sa coûter la vie au malade,
 comme je le dirai dans son lieu. je veux faire
 connoître par ces observations qu'il y a peu de gens
 qui connoissent bien ce que c'est que la fluctuation
 dont il s'agit ici; car ce n'est pas seulement ce qui



Donne cette Sensation que tout fluide Enfermé
est dans une Seule cavité; car le fluide infiltre
dans les cellules des graisses ou dans tout autre tissu
cellulaire a bien une espèce de fluctuation que
l'on sent au touché; mais la fluctuation d'un fluide
renfermé dans une poche ou un Kiste produit
une Sensation bien différente et pour s'en voir dis-
tinguer l'un et l'autre; il ne suffit d'avoir l'organe
du touché délicat il faut être accoutumé de
bonne heure et en avoir ou beaucoup; je dirai
même qu'il faut y avoir été trompé une fois au
moins pour s'en voir éviter le piège.

Dans l'espèce dont il s'agit pourvu qu'on ne blesse
point le malade. l'erreur n'est pas grande; mais lors
qu'on prend un Sarcocelle, Suppurant on pourroit pour
une hydrocele, par épanchement et qu'on y porte
le troi cart, il peut y avoir plus d'écoulement, comme
on pourroit le voir par les observations que je
rapporterai cy après. Il résulte de tout ce que
j'ai dit que pour bien juger de la nature de
l'hydrocele, il faut s'en voir ce qui s'est passé
depuis le commencement de la maladie, on y
trouve la fluctuation et la fluctuation au degré.

D'avidance que j'ai établi cy dessus
 neient pas le tout de Sçavoir connoître l'hydrocelle
 lors qu'il est seul; il faut distinguer les autres
 maladies qui le rendent compliqué et Sçavoir même
 qu'il peut y arriver des changements c'est ce que
 je crois avoir observé le premier. le testicule
 gonfle, est que quelque fois douloureux, et d'autre
 fois il est sans doulour. lors qu'il est douloureux
 le gonflement augmente en peu de temps si l'on ne
 remédie il se fait Suppuration soit dans le
 voisinage soit dans le Corps du testicule, d'autre
 fois le dépôt se termine par pourriture ou si l'on
 appaise la doulour par les Remèdes généraux et
 topiques il se forme une tumeur Schisteuse
 à la quelle on donne ordinairement le nom de
 Sarcocelle cette tumeur augmente et prend des
 formes irrégulières comme le cancer, elle forme
 même et produit des chairs fongueuses et saigne
 Semblable au cancer ulcéré cette tumeur cependant
 peut quelque fois reprendre le parti de la Résolution
 soit qu'on attaque la cause interne qui la
 a produit comme lors qu'elle est vénérienne ou
 Scrophuleuse ou administre les Specificques



De la vésicle ou Du Scorbute ou que n'y ayant
aucun vice elle se dissipe par d'autres remèdes
fondans soit pris intérieurement ou extérieurement
appliqués, c'est ce que je n'entreprend point
de traiter ici ne m'attachant qu'à ce qui regarde
l'opération manuelle de chirurgie.

Ces sortes de gonflemens testiculaires, quoiqu'ils
se dissipent laissent presque toujours une dureté
à l'épididyme laquelle dure toute la vie; enfin
le gonflement testiculaire ne se dissipant pas
il se forme un hydrocele qui vient peu à peu;
c'est ce que j'ai souvent observé, ces hydrocelles
dans la suite augmentent au point de cacher
le testicule, comme il a été remarqué cy-
dessus de sorte que l'on ignore en quel état
est le testicule l'expérience m'a appris que
quelque fois il se maintient dans sa dureté
et qu'il augmente même dureté et en volume,
et que d'autre fois il reprend presque sa
consistance et sa grosseur naturelle, que d'autre
fois il se flétrit s'affaisse et s'aneantit presque
c'est ce que j'ai observé plusieurs fois après
avoir vidé les eaux par la ponction